

## Dirichletov princíp (DP)

1. Možných súčtov je 11 (od 2 po 12), preto treba hodiť aspoň 12-krát.
2. Možných súčtov je 16 (od 3 po 18), preto treba hodiť aspoň  $(3 \cdot 16 + 1) = 49$ -krát.
3. a) Rozlíšené kocky : rôznych dvojíc je  $6 \cdot 6 = 36$ , treba aspoň  $2 \cdot 36 + 1 = 73$  hodov.  
b) Nerozlíšené kocky : rôznych dvojíc je 21, treba aspoň  $2 \cdot 21 + 1 = 43$  hodov.
4. a) Sporom. Ak sú všetky menšie ako  $\frac{b}{n}$ , súčet je menší ako  $n \cdot \frac{b}{n} = b$ . Spor.  
bcd) Až na ostré/neostré/obrátené nerovnosti to isté ako a).
5. Z Eulerovej vety  $\Rightarrow$ , že mnohosten má 21 hrán, teda súčet stupňov vrcholov je 42. Keďže  $42 \geq 37 = 9 \cdot 4 + 1$ , z DP  $\Rightarrow$ , že z niektorého vrcholu vychádza aspoň 5 hrán, q.e.d.
6. Hrán je 11, súčet počtov hrán v stenách 22, stien 7, z DP  $\Rightarrow$ , že  $\exists$  stena s aspoň 4 hranami, ale keďže každá stena má aspoň 3 hrany, majú steny dokopy aspoň 21 hrán, preto jediná možnosť je, že jedna stena má 4 hrany a všetky ostatné po 3 hrany.
7. Záhradu  $80 \times 90$  rozdelíme na  $10 \times 18$  obdĺžnikov tvaru  $8 \times 5$ . Máme 365 stromov v 180 obdĺžnikoch, z DP  $\Rightarrow$ , že v niektorom sú aspoň 3.
8. Obdĺžnik  $27 \times 36$  rozdelíme na  $9 \times 18$  obdĺžnikov tvaru  $3 \times 2$  a každý z nich uhlopriečkou na dva trojuholníky s plochou 3. Máme 1945 bodov v 9.18.2 = 324 trojuholníkoch, z DP  $\Rightarrow$  q.e.d.
9. 13 vysieláčov pokryje max. plochu  $13 \cdot \pi \cdot 80^2 = 83200 \cdot \pi < 268138 \text{ km}^2$ .
- 10.
- 11.
- 12.
13. Štvorec rozrežeme na 25 štvorcíkov so stranou  $\frac{1}{5}$ . Z DP v niektorom ležia aspoň 3 z 51 bodov. Keďže  $\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{5} = \frac{\sqrt{2}}{10} < \frac{1}{7}$ , celý tento štvorec leží v kruhu so stredom v jeho priesečníku uhlopriečok a polomerom  $\frac{1}{7}$ . V tomto kruhu ležia teda aspoň 3 body, q.e.d.
14. Označme naše čísla  $c_1, \dots, c_{82}$ . Ak niektoré z čísel  $c_1 - c_2, c_1 - c_3, \dots, c_1 - c_{82}$  dáva po del. 81 zvyšok 0, vyhrali sme. Ak nie, máme 81 čísel, ktoré dávajú nanaajvyš 80 zvyškov, podľa DP niektoré dve dávajú rovnaký zvyšok. BUNV nech sú to  $c_1 - c_i = 81a + z$ ,  $c_1 - c_j = 81b + z$ , pričom  $i \neq j$  a  $0 \leq z < 81$ . Potom ale  $c_i - c_j = (c_1 - c_j) - (c_1 - c_i) = (81b + z) - (81a + z) = 81(b - a)$ .
15. Dokážeme tvrdenie, z ktorého budú vyplývať tvrdenia 16 a 17. Ku každému  $n$  nesúdeliteľnému s 10 existuje číslo tvaru  $11 \dots 1$ , ktoré je ním deliteľné. Dôkaz: Zoberme čísla  $1, 11, \dots, 11 \dots 1$ , z ktorých posledné má  $n+1$  cifier. Z DP niektoré dve dávajú rovnaký zvyšok po delení  $n$ . Preto ich rozdiel je deliteľný  $n$ . (Tým je dokázané tvrdenie 16, lebo ich rozdiel je tvaru  $11 \dots 100 \dots 0$ .) Pre  $n$  nesúdeliteľné s 10 z toho dostávame, že keďže  $n$  delí  $11 \dots 100 \dots 0 = 11 \dots 1 \cdot 10^k$ , delí aj  $11 \dots 1$ .
16. Keďže prvočísla rôzne od 2 a 5 sú nesúdeliteľné s 10, môžeme použiť predchádzajúcu vetu.

17. Označme čísla  $a_1, \dots, a_n$ . Ďalej označme  $b_i = a_1 + \dots + a_i$ . Ak niektoré  $b_i$  dáva zvyšok 0 po delení  $n$ , hotovo, inak máme  $n$  čísel, ktoré dávajú najvac  $n - 1$  zvyškov. Z DP niektoré 2 dávajú rovnaký zvyšok, preto ich rozdiel  $b_j - b_i$  je deliteľný  $n$ . Ich rozdiel ale je  $a_{i+1} + \dots + a_j$ .
- 18.
19. Vyplýva z úlohy 20.
20. Zoberme čísla  $p, p^2, \dots, p^{10^{n+1}+1}$ . Niektoré dve z nich podľa DP dávajú rovnaký zvyšok po delení  $10^{n+1}$ . Nech sú to  $p^k$  a  $p^l$ . Potom  $10^{n+1} | p^l - p^k = p^k(p^{l-k} - 1)$ . Keďže  $10$  je nesúdeliteľné s  $p$ ,  $\Rightarrow$  z toho, že  $10^{n+1} | p^{l-k} - 1$ , čiže  $p^{l-k} \equiv 1 \pmod{10^{n+1}}$ . To ale znamená, že  $p^{l-k}$  končí skupinou  $n$  núl a jednotkou.
21. Sporom. Keby boli najviac 2 ofic. jazyky, tak oficiálnymi jazykmi hovorí dokopy najviac 30 delegátov. Každým z ostatných 9 jazykov hovoria najviac 4 delegáti. To ale znamená, že delegátov je najviac  $66 - \text{spor}$ .
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
- 35.

### Spočítateľné množiny

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

- 8.
- 9.
- 10.
11. Intervalu  $(a, b)$  priradíme dvojicu  $a, b \in Q \times Q$ . Zjavne je to injekcia, preto má množina vš. intervalov s rac. koncami mohutnosť nanajvyš rovnú mohutnosti množiny  $Q \times Q$ , tá je ale spočítateľná.
12. Napr.  $X = Q^n$ . Rac. čísla sú hustá podmnožina  $R$ , teda pre ľubovoľné  $\forall r, \varepsilon \in R \exists q \in Q; |r - q| < \varepsilon$ . Preto keď máme  $a = (a_1, \dots, a_n)$ , stačí nájsť  $x_1, \dots, x_n \in Q; |a_i - x_i| < \frac{\varepsilon}{n}$ . Také  $x_i$  určite existujú a zároveň je potom  $\sum |x_i - a_i| < n \cdot \frac{\varepsilon}{n} = \varepsilon$ , takže  $X = Q^n$  naozaj vyhovuje.
13. V každom z nich leží aspoň jedno rac. číslo. Každému intervalu priradíme niektoré rac. číslo z neho. Keďže sú disjunktné, je to injekcia, teda mohutnosť množiny intervalov je nanajvyš rovná mohutnosti  $Q$ , teda množina intervalov je spočítateľná.
14. a) Z analýzy vieme, že pre rastúcu funkciu je  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \sup_{x < a} f(x)$ .  
b) ... nejakou cez disjunktné intervaly na osi  $y$ .
15. bolo na cvikách
16. Zjavne  $T_k(0) = \{(0, 0, \dots, 0, \dots)\}$ , preto  $|T_k(0)| = 1$ .

Keď  $X$  obsahuje aspoň 2 prvky (BUNV 1 a 2), môžeme prirodzenému číslu  $n$  priradiť postupnosť  $n$  jednotiek a dvojky, preto je určite  $|X| \succeq \aleph_0$ . Špeciálne  $|T_k(0, 1)| \succeq \aleph_0$ ,  $|T_k(N)| \succeq \aleph_0$  a  $|T_k(Q)| \succeq \aleph_0$ .

Zobrazme každú postupnosť z  $T_k(X)$  na konečnú postupnosť, ktorú z nej dostaneme, keď z konca vynecháme všetky rovnaké členy okrem jedného. (T.j. napr. postupnosť 3, 1, 4, 1, 5, 2, 2,  $\dots$ , 2,  $\dots$  na 3, 1, 4, 1, 5, 2.) Toto je zjavne injekcia, preto mohutnosť  $T_k(X)$  je nanajvyš rovná mohutnosti množiny všetkých konečných postupností prvkov  $X$ .

Množina všetkých konečných postupností 0 a 1 má mohutnosť  $\aleph_0$ , lebo každá z nich zodpovedá nejakému konečnému desatinnému rozvoju reálneho (a teda zároveň racionálneho) čísla. (Teda napr. postupnosti 0,1,0,1,1,1 priradíme číslo 0,0101111 – tú jednotku na konci musíme ku každému pridať kvôli postupnostiam, ktoré končia 0.) Množinu kon. postupností prir. čísel zobrazíme do množiny kon. postupností 0 a 1 tak, že číslo  $n$  zakódujeme postupnosťou  $n$  núl a jednotkou. Množinu kon. postupností rac. čísel zobrazíme do postupnosti prir. čísel tak, že číslu  $\frac{p}{q}; p \in Z, q \in N, (p, q) = 1$  priradíme 1,  $p, q$  ak  $p \geq 0$  a 2,  $-p, q$  ak  $p < 0$ . Preto aj množina všetkých kon. postupností prirodzených, resp. racionálnych čísel má mohutnosť  $\aleph_0$ .

Teda je  $|T_k(0, 1)| \preceq \aleph_0$ ,  $|T_k(N)| \preceq \aleph_0$ ,  $|T_k(Q)| \preceq \aleph_0$ , a teda podľa C-B vety  $|T_k(0, 1)| = |T_k(N)| = |T_k(Q)| = \aleph_0$ .

Zjavne každému reálnemu číslu môžeme priradiť nekonečnú postupnosť zloženú zo samých takých čísel, preto  $|T_k(R)| \succeq c$ . Keby sme dokázali, že mohutnosť množiny všetkých konečných postupností reálnych čísel je  $c$ , boli by sme hotoví. Keďže sa mi to už nechce rozpisovať, využijem bez dôkazu, že  $|R^n| = |R| = |(0, 1)|$ . Každú konečnú postupnosť  $a_1, \dots, a_n$  reálnych čísel viem podľa práve uvedenej vety priradiť číslo  $x \in (0, 1)$ . Keď jej priradím číslo  $n + x$ , dostanem takto injekciu z množiny všetkých kon. postupností reálnych čísel do  $R$ , takže naozaj  $|T_k(R)| = c$ .

17. Keďže  $P$  je spoč. množina, môžeme jej prvky označiť  $P = \{p_1, p_2, \dots\}$ . Keď bude druhý hráč ťahať tak, že v  $n$ -tom ťahu dá číslicu, ktorú  $p_n$  nemá na  $2n$ -tom mieste, výsledná postupnosť nemôže patriť do  $P$ . (Dôkaz ako pri Cantorovej diagonálnej metóde - keď tam patrí, nech je to  $p_k$ , ale od  $p_k$  sa výsledná postupnosť líši na  $2k$ -tom mieste.)
18. Pre  $P = 0, 1^N$  nech druhý hráč ťahá ako chce, výsledok bude patriť do  $P$ . Preto druhý hráč nemá vyhrávajúcu stratégiu, čiže  $P$  nie je spočítateľná.
19. Čo je podgrupa ?

### Príklady rôznych typov

- 1.
- 2.
3. Určíte vieme vybrať  $k + 1$  čísel – napr. všetky nepárne. Stačí dokázať, že nevieme viac. Indukciou.
  - 1° Z 1 čísla vieme vybrať najviac 1.
  - 2° Majme  $2k + 1$  čísel. Ak vyberieme číslo  $2k + 1$ , zo zvyšných žiadna dvojica nesmie mať súčet  $2k + 1$ , preto z každej z dvojíc  $[1, 2k]$ ,  $[2, 2k - 1]$ ,  $\dots$ ,  $[k, k + 1]$  môžeme vybrať najviac jedno číslo, dokopy najviac  $k + 1$  čísel.  
 Ak číslo  $2k + 1$  nevyberieme: Ak vyberieme  $2k$ , tak už z každej z dvojíc  $[1, 2k - 1]$ ,  $\dots$ ,  $[k - 1, k + 1]$  môžeme vybrať najviac jedno a navyše môžeme ešte vybrať  $k$ . Takže vyberieme najviac  $1 + (k - 1) + 1 = k + 1$  čísel. Ak nevyberieme ani  $2k$ , vyberáme vlastne už len z  $2k - 1$  čísel, z nich podľa ind. predp. vieme vybrať najviac  $k$  čísel.  
 Preto môžeme vybrať najviac  $k + 1$  čísel.
4. Každý súčet je z množiny  $\{-n, \dots, -1, 0, 1, \dots, n\}$ . Tá má  $2n + 1$  prvkov, riadkov, stĺpcov a diagonál je však dokopy  $2n + 2$ , preto taká matica neexistuje.
5. Každý má medzi 0 a  $n - 1$  známymi. Ak žiadni dvaja nemajú rovnako, znamená to, že jeden má 0 známych, atď., až jeden má  $n - 1$  známych. Potom ale ten, čo pozná všetkých, sa pozná aj s tým, ktorý nepozná nikoho, spor.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. Možné výsledky sú (v tvare [jednotky, dvojky, trojky]) :  $[3, 0, 0]$ ,  $[0, 3, 0]$ ,  $[0, 0, 3]$ ,  $[2, 1, 0]$ ,  $[2, 0, 1]$ ,  $[1, 2, 0]$ ,  $[1, 0, 2]$ ,  $[0, 2, 1]$ ,  $[0, 1, 2]$ ,  $[1, 1, 1]$ . Možných výsledkov je teda 10, študentov 41 a z DP  $\Rightarrow$  dok. tvrdenie.
11. Predstavme si kompletný graf, ktorého vrcholy sú členovia komisie. Ofarbíme hranu medzi  $A$  a  $B$ , keď sú spolu na zasadnutí. Zo zadania vieme, že každú hranu ofarbíme najviac raz. Pri jednom zasadnutí však ofarbíme  $\binom{10}{2} = 45$

hrán, zasadání bolo 40, teda tento graf musí mať aspoň 1800 hrán.  $K_n$  má  $\binom{n}{2}$  hrán. Je teda

$$\begin{aligned} 1800 &\leq \binom{n}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{2}n \\ n^2 - n - 3600 &\geq 0 \end{aligned}$$

Zjavne pre  $n \leq 60$  je  $n^2 - n - 3600 < n^2 - 3600 \leq 60^2 - 3600 = 0$ , preto  $n > 60$ .

12. Podobne. Vrcholy sú ľudia, keď vytvoríme komisiu, všetkých členov pospájame hranami. Zo zadania  $\Rightarrow$ , že žiadni dvaja ľudia nie sú spolu vo viac ako 1 komisii, preto každú hranu ofarbíme max. raz. Hrán je  $\binom{25}{2} = 300$ , 1 komisia ofarbí 10 hrán, preto je komisii najviac 30.
13. To isté ako úloha 7, len v svetlomodrej.
- 14.
- 15.
- 16.
17. Teda toto bol buď blbý vtip, alebo som to zle pochopil.
- 18.